

Parainocellia bicolor (Costa, 1855)



Esemplare adulto ♀ Foto A. Di Leo
www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=26255



Larva adulta Originale



Esemplare ♀ allo stadio pupale Originale



Esuvia pupale Originale



© Claudio Labriola 2009



© Claudio Labriola 2009



Esemplare adulto maschile

Specie relativamente euriecia a larve subcorticicole (Aspöck et alii, 1980). Il periodo di volo degli adulti è risultato assai influenzato dalle condizioni climatiche. In pianura è limitato al mese di maggio, nelle aree appenniniche è invece compreso fra giugno e luglio. (Pantalone, 1989a). Lo sviluppo preimmaginale dura almeno due anni, lo stadio pupale 1/2 settimane (Aspöck et al., 1991).

Locus typicus italiano: dintorni di Napoli

Stadio di svernamento: larva. **Parassitoidi:** *Nemeritis caudatula* Thoms. e *N. specularis specularis* Horstmann, entrambe le specie sulla Sila, Calabria. Ampiezza dell'ala anteriore delle immagini: da 8,5 a 14 mm.; ♀ generalmente più grande del ♂ (Aspöck et al., 1991).

Distribuzione regionale italiana:

Piemonte; Lombardia; Trentino Alto-Adige; Veneto; Liguria; Emilia Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzo; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia.

Pubblicazioni e segnalazioni che citano questa specie in Italia:

A.Costa, 1855; Albarda, 1891; Navás, 1928b, 1933, 1934a, 1935; Principi, 1952, 1961, 1966 (?);

Castellani, 1957; Crowson, 1958; Eglin-Dederding, 1967; Aspöck et al., 1965, 1966b; Aspöck et al., 1980; Aspöck et al., 1991; Contarini, 1987; Pantaleoni, 1988, 1990a,b,c,d; Letardi, 1991b, 1994a, 1998b, 2003, 2007a, 2015, 2022; Covassi et al., 1991; Divietri, 1993; Pantaleoni et al., 1994; Letardi & Pantaleoni, 1996; Hellrigrl et al., 1996; Maltzeff, 1997, 1998; Güsten, 1998; Pantaleoni & Letardi, 1998; Binazzi et al., 2004; Rausch et al., 2004; Letardi & Biscaccianti, 2005; Badano, 2006a,b, 2008c, 2010; Sechi, 2007 (?); Di Leo, 2007b; Morelli & Romano, 2007; Norbiato, 2007; Milus, 2008; Miserocchi, 2008; Fontanesi, 2008e; Spanò, 2008; Perilli, 2009b; Galliani, 2009b; Aspöck H. et U., 2009; Carotti et al., 2009; Contarini, 2009; Labriola, 2009a; Badano & Letardi, 2010; Barraco, 2010; Colacurcio, 2010c; Cortese, 2010; Latini, 2010a, c; Letardi et al., 2010; Marra, 2010; Paglialunga, 2010c, e, y, 2011a, 2013a; Risoldi, 2010; Winterton et al., 2010; Bastianini, 2011; Bianchi, 2011; Bondini, 2011c; De Vincenzo, 2011; Grazioli, 2011; Haring et al., 2011; Lenzini, 2011c, 2013a; Lucarelli, 2011; Luthi, 2011c, 2012a, 2013a; Piredda, 2011i; Romano, 2011a; Violi, 2011; Gigli, 2012a; Hallgass, 2012a; Marinelli, 2012; Terzani et al., 2012; Perino, 2013d; Stagno, 2013a; Turchetti, 2013a; AAVV, 2014a,b, 2015b, 2016a,b, 2017a,b, 2018a,b, 2019a, 2020a,b, 2021a,b, 2022a,b, 2023a,b, 2024a; Baldacchino et al., 2017 (?); Hiermann et al., 2018; Letardi & Scalercio, 2018; Sforzi et al., 2019e; Baldacchino et al., 2021;



tutti i materiali del sito sono rilasciati con [Licenza Creative Commons - Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo - 2.5 - Italia](#).